

关于水俣病

水俣病的概念

水俣病是指从工厂里排放的甲基汞化合物蓄积在鱼的体内，吃了这些被污染的鱼而引起的中毒性神经疾病。另外，怀孕中的母亲吃了被污染的鱼后，经由胎盘致使胎儿受到甲基汞中毒，带着类似于脑性小儿麻痹的障碍出生的胎儿性水俣病。水俣病不是通过空气和食物传染的传染病，也不是遗传病。

1956 年在熊本县水俣湾的周边首次确认了水俣病的发生。由于环境污染而引起的水俣病对健康的危害以及对自然环境的破坏，如此庞大的受害和对社会的深刻影响，被称作是人类历史上没有先例的公害。

水俣病的症状

水俣病的主要症状有，手脚感觉障碍，运动失调，视野变窄，听力障碍，平衡机能障碍，言语障碍，手脚颤抖，眼球运动障碍等。

重症患者会出现类似发狂的状态和意识不明的状态，甚至还会死亡。另外，轻症患者的症状有，头痛和容易疲劳，味觉迟钝等与其他病难以进行区分的症状。

<注释>

发生初期的水俣湾周边主要症状的患者居多，发病后 3 个月以内死亡的有 16 例，1965 年时候的死亡率达到了 44.3%。在这之后，以拥有主要症状中的几种症状的患者和轻症患者居多。

水俣病的治疗

水俣病的治疗法有，早期的时候用药剂让甲基汞排泄出来的原因疗法。但是水俣病的有效治疗法到现在还没有找到，现在的主要治疗法是服用止痛药和进行机能康复训练等。

